


# TIÊM VẮC XIN PHÒNG BỆNH HO GÀ



## THÔNG TIN CHUNG VỀ BỆNH HO GÀ

- ✓ Là bệnh do trực khuẩn Gram âm *Bordetella pertussis* gây ra.
- ✓ Bệnh lây truyền qua đường hô hấp khi các giọt bắn từ người bệnh ho hoặc hắt hơi. Ho gà có tính lây nhiễm cao. Một người bệnh có thể lây cho 80-90% những người tiếp xúc gần khi họ chưa có miễn dịch.
- ✓ Biểu hiện: ho dữ dội, khó thở, hít vào tạo tiếng "rít", chảy nước mũi, sốt.
- ✓ Bệnh có thể gây một số biến chứng phổ biến như ngưng thở, viêm phổi, sụt cân. Có thể có biến chứng nặng như co giật, bệnh não, tử vong; ho dữ dội gây thoát vị, gãy xương sườn, xuất huyết kết mạc.

## TIÊM VẮC XIN PHÒNG BỆNH HO GÀ



### ● Lợi ích

- ✓ Phòng ngừa bệnh ho gà.
- ✓ Bảo vệ cho thai nhi, trẻ sơ sinh trong những tháng đầu đời.
- ✓ Giảm mức độ nặng của bệnh.

### ● Những điều cần lưu ý

- ✓ Miễn dịch do vắc xin hoặc do mắc bệnh tự nhiên sẽ suy giảm sau 5-10 năm.
- ✓ Tiêm cho phụ nữ mang thai trong ba tháng giữa hoặc ba tháng cuối thai kỳ để bảo vệ cho trẻ phòng bệnh ho gà.

## LỊCH TIÊM

### ● Người lớn:

- ✓ Tiêm 1 liều duy nhất.

### ● Phụ nữ có thai:

- ✓ Nên tiêm 1 liều trong mỗi thai kỳ (tốt nhất từ tuần 27 đến 36).

### ● Đối với trẻ em:

- ✓ Tiêm lần 1: khi trẻ đủ 02 tháng tuổi.
- ✓ Tiêm lần 2: ít nhất 01 tháng sau lần 1.
- ✓ Tiêm lần 3: ít nhất 01 tháng sau lần 2.
- ✓ Tiêm nhắc lại: khi trẻ đủ 18 tháng tuổi.

## LỊCH TIÊM PHÒNG

	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

